

Эпиглоттит

Памятка для пациента



Эпиглоттит – что это?


Эпиглоттит – это остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и окружающих тканей, которое может привести к быстрому жизнеугрожающему нарушению проходимости дыхательных путей.

Эпиглоттит встречается редко, преимущественно у детей, но может встречаться даже у взрослых.

Эпиглоттит вызывается гемофильной инфекцией (*Haemophilus influenzae* тип b) (>90%).

В странах, где введена массовая иммунизация против гемофильной инфекции, эпиглоттиты встречаются реже.

В России проводится вакцинация детей от гемофильной инфекции.




Симптомы и клиническая картина эпиглоттита

Эпиглоттит является тяжелой бактериальной инфекцией:

- заболевание обычно начинается остро с высокой температуры и нарушения общего состояния,
- характерны боль в горле,
- ребенок может сильно «сжимать зубы»,
- может наблюдаться вытекание слюны изо рта,
- поза «треножника»,
- приоткрытый рот,
- быстрое развитие шумного дыхания на вдохе,
- западение надгортанника в положении на спине.

Типичного для крупа лающего кашля не отмечается.



Что делать при подозрении на эпиглоттит?

**Если вы заподозрили острый эпиглоттит у
вашего ребенка: немедленно вызовите
бригаду скорой (неотложной) помощи!!**

**Ребенка с эпиглоттитом необходимо
госпитализировать в больницу.**

**При эпиглоттите запрещается ингалировать,
давать снотворные и седативные средства,
провоцировать беспокойство, обязательна
антибактериальная терапия.**

Антибиотики назначает только врач.

**При назначении антибиотиков необходимо
соблюдение режима применения и
продолжительности лечения – по
назначению врача!**